

インクレミンシロップについて

■ 薬効・用法・用量・形状 ■

薬効：この薬は体内の欠乏した鉄分を補給し貧血を治します。

用法・用量：1日1回 医師の指示量

色：橙色透明 **味**：甘い **香り**：チェリー



■ お薬の飲ませ方 ■

- ① 少量の白湯（約10ml）を哺乳瓶に準備し、人肌まで冷ましてください。
- ② 薬瓶から1回分のお薬を添付のスポイトで計り取ってください。
- ③ 1回分のお薬を白湯に混ぜ、泡立たないように軽く振り、飲ませてください。

■ 副作用と注意事項 ■

副作用：悪心・嘔吐・食欲不振・腹痛・下痢・便秘・
胃部不快感・光線過敏症・蕁麻疹 など

注意事項：服用中、便が黒くなることがあります。これは吸収されない鉄によるものですので、心配は要りません。また光の影響で薬の効果が弱くなる恐れがありますので、添付の遮光袋に入れて保管してください。



■ よくあるQ&A ■

Q：持って帰る薬が1ヶ月以上あるが、室温保管でいいのですか？

A：ご自宅では冷蔵庫で保管した方が良いでしょう。ただし、冷やしすぎると（0度以下になると）、結晶ができてしまう恐れがありますので御注意ください。また、光に弱いので添付の遮光袋に入れて保管してください。

Q：副作用で便秘になりますか？その時はどうしたらいいですか？

A：便秘にも下痢にもなる可能性があります。症状が出たら、主治医に御相談ください。

Q：どうして貧血と分かったのですか？いつまで飲ませるのですか？

A：血液検査をして医師が診断しました。内服期間は医師が血液検査の結果をみながら決めていきます。

Q：お薬を飲ませたら吐いてしまいました。どうすればいいですか？

A：内服してからどれくらいの時間で吐いたか？また吐いた量によっても対応は違ってきます。1つの目安として10分以内なら再度服用させてください。10分以上経過していれば再度服用しないで様子を見てください。

